Signaturen der Domestikation

Betreff: VOR Etablierung der Rassekaninchenzucht

Albert, et al., 2012¹⁾ gingen der Frage nach, ob die Domestikation unterschiedlicher Tierarten, hinsichtlich verhaltensbezogener Aspekte, mit vergleichbaren Änderungen auf molekularer Ebene einhergegangen ist; analog z.B. zur Fellhaarfarbe, die bei vielen domestizierten Tierarten, wie Hunde, Schweine, Pferde, Hühner oder Kaninchen, vom MC1R-Rezeptor beeinflusst wird.

Dazu verglichen sie Transkriptome aus Gehirnen (Cortex, Frontallappen) von Haushunden (Canis familiaris) und Wölfen (Canis lupus), Hausschweinen und Wildschweinen (Sus scrofa), sowie Hauskaninchen und Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus; je 3x weiblich, 3x männlich, nicht verwandt). Zusätzlich wurden Hausmeerschweinchen (Cavia porcellus) und wilde Meerschweinchen (Cavia aperea) einbezogen, sowie zwei Linien von Ratten, die seit 1971, ausgehend von Wildfängen, auf zahmes oder aggressives Verhalten gegenüber Menschen selektiert worden sind.

Innerartlich (domestiziert vs. wild) unterschieden sich die mRNA-Sequenzen nur geringfügig. Bei Kaninchen wurden 31 signifikant unterschiedlich exprimierte Gene identifiziert (– das auffallendste Gen mit signifikant höherer Expression bei Hauskaninchen war PPL, ein mit dem Zytoskelett assoziiertes Protein, das eine Rolle bei der Zelladhäsion spielt; das auffallendste Gen mit signifikant geringerer Expression bei Hauskaninchen war MYO5C, ein Motorprotein, das eine Rolle beim Transport von sekretorischen Granula spielt). Und nur bei einem dieser Gene, FNDC1, könne möglicherweise eine Domestikations-assoziierte, positive Selektion eines regulatorischen Elements zugrunde liegen. Gene, die Art-übergreifend, bis zu einem gewissen Ausmaß, ähnliche Domestikations-assoziierte Expressions-Unterschiede zeigten, waren COL14A, SOX6, PROM1 und SOCS4. Zusammenfassend seien jedoch die meisten Domestikations-assoziierten Veränderungen der Genexpression, in Bezug auf Verhaltensweisen, **tierartspezifisch**.

Zur Identifizierung Domestikations-assoziierter genomischer Signaturen bei Kaninchen (*O. cuniculus*) sequenzierten Carneiro, *et al.*, 2014²⁾ gepoolte DNA-Proben, jeweils von verschiedenen Hauskaninchenrassen (Hasenkaninchen, Holländer, Französische Widder, *Champagne d'Argent*, Belgische Riesen, Weiße Neuseeländer, 6 Pools) und von Wildkaninchen (*O. c. c.* aus Frankreich, 3 Pools; *O. c. c.* oder *O. c. a.* von der Iberischen Halbinsel, 11 Pools).

Ergebnisse:

- Als Beispiele für Gene, die mit entdeckten *selective sweeps* assoziiert werden konnten, wurden genannt:
 - GRIK2, mit einem nahezu fixierten Allel bei Hauskaninchen und möglicher Auswirkung auf das Gehirn, bzw. auf Verhaltensweisen;
 - SOX2, welches einen Transkriptionsfaktor codiert, der für die Erhaltung von Stammzellen erforderlich sei.
- Eine hoch signifikante Anreicherung von differenzierten SNPs wurde insbesondere in nichtcodierenden, regulatorischen DNA-Abschnitten entdeckt – Für die meisten dieser Regionen konnten Zusammenhänge mit der Embyonalentwicklung, insbesondere der Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems abgeleitet werden.
- Bei keinem der differenzierten SNPs in codierenden Regionen handelte es sich um eine Nonsense- oder Frame-shift-Mutation, was als Hinweis darauf angesehen wurde, dass bei der Domestikation ein Verlust, bzw. eine Inaktivierung von Genen keine wesentliche Rolle gespielt hat.

18:52

Autosomale *Missense*-Mutationen waren großteils nicht fixiert und vermutlich Folge von *Hitchhiking*-Effekten, ohne funktionelle Bedeutung. Jedoch waren zwei solcher *Missense*-Mutationen auffällig: 1) Gln813→Arg813-Substitution im TTC21B-Gen mit Bedeutung in der Signalübertragung während der Embryonalentwicklung; 2) Arg1627→Trp1627-Substitution im KDM6B-Gen mit regulatorischer Bedeutung während der Embryonalentwicklung.

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass bei Hauskaninchen nur sehr wenige Loki vollständig fixiert sind (weder codierende noch nicht-codierende, konservierte Loki); stattdessen wurden an vielen Loki Verschiebungen der Allelfrequenzen festgestellt.

Während der Domestikation wurden vorrangig Gene verändert, welche die Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems beeinflussen – eine Veränderung, die es den Tieren ermöglichte, den Menschen und seine Umwelt zu tolerieren.

Abschließend wurde vermutet, dass sich zahmes Verhalten bei Kaninchen und anderen Haustieren aufgrund einer komplexen genetischen Basis entwickelt hat, wobei vorrangig viele Mutationen mit geringer Wirkung, anstelle von kritischen Veränderungen an nur wenigen Loki eine Rolle gespielt haben.

11 2 328

1)

Albert, F. W., Somel, M., Carneiro, M., Aximu-Petri, A., Halbwax, M., Thalmann, O., ... & Pääbo, S. (2012). A comparison of brain gene expression levels in domesticated and wild animals.

Carneiro, M., Rubin, C. J., Di Palma, F., Albert, F. W., Alföldi, J., Barrio, A. M., ... & Andersson, L. (2014). Rabbit genome analysis reveals a polygenic basis for phenotypic change during domestication. Science, 345(6200), 1074-1079.

From:

http://www.wikikanin.de/ - Wikikanin

Permanent link:

http://www.wikikanin.de/doku.php?id=genetik:signaturen_domestikation&rev=1751302323

Last update: 2025/06/30 18:52



http://www.wikikanin.de/ Printed on 2025/12/01 19:55