

Haarfarbe - Vienna White

Assoziiertes Gen:

Chromosom:

Vererbung: monogen


Tabelle: Bekannte Varianten

Symbol	Variante/ Mutation(en)		Funktion/ Mechanismus	Phänotyp	Rassen
	deutsch (englisch)	DNA			
X (V)	Wildtyp				
x (v)			Genotyp x/x wirkt wohl epistatisch in einer höheren Ebene des Pigmentierungsprozesses, so dass die Entwicklung, Migration oder Funktion der Melanozyten beeinflusst werden; keine Tyrosinase-Transkripte in der Haut (nur im Auge) ¹⁾	Homozygote (x/x): weißes Fellhaar, blaue Augen; Heterozygote (X/x): weiße Abzeichen, (partiell) blaue Augen möglich	x/x: Weiße Wiener (Österreich) ²⁾

Geschichte

Um das Jahr 1907 entstand in Österreich das Weiße Wienerkaninchen. ³⁾(S. 114) Als Ausgangstiere dienten wohl hauptsächlich Holländerkaninchen. ⁴⁾(S. 97-98)

Phänotypen (Beispiele)

<p>Leuzistisch weiß/ weiß Blauauge (BA)</p>		<p>Abb. 1: Zwergfuchskaninchen weiß BA ©KH</p>
--	---	--

4 0 902

Last update:

2025/08/11
20:00

genetik:haarfarbe_vienna_white https://www.wikikanin.de/doku.php?id=genetik:haarfarbe_vienna_white&rev=1754935221

1) 2)

Aigner, B., Besenfelder, U., Müller, M., & Brem, G. 2000. Tyrosinase gene variants in different rabbit strains. *Mammalian Genome*, 11(8).

3)

Nachtsheim, H., & Stengel, H. 1977. *Vom Wildtier zum Haustier*. 3. Auflage. Berlin, Hamburg: Paul Parey. ISBN 3-489- 60636-1.

4)

Mahlich, P. 1919. *Unsere Kaninchen - Ein ausführliches Handbuch für alle Züchter und Liebhaber von Kaninchen*. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin: Fritz Pfenningstorff.

From:

<https://www.wikikanin.de/> - **Wikikanin**

Permanent link:

https://www.wikikanin.de/doku.php?id=genetik:haarfarbe_vienna_white&rev=1754935221

Last update: **2025/08/11 20:00**

