

Prävalenz

Definition

Die Prävalenz ist ein epidemiologisches Maß, welches die Anzahl bzw. Häufigkeit eines Ereignisses wie z. B. einer Erkrankung in einer bestimmten Population zu einem Zeitpunkt (Punkt-Prävalenz) oder in einem bestimmten Zeitraum angibt¹⁾²⁾.

Berechnung der Prävalenz, in % = Anzahl der Erkrankten / Anzahl der Stichprobe * 100

Beispiel für die Prävalenz der Ohrerkrankungen von Heimkaninchen in einer Studie von O'Neill et al., 2024³⁾ mit einer Grundgesamtheit von 162.107 Heimkaninchen:

- Anzahl der zufälligen Stichprobe: 3.933
- Anzahl der Diagnosen „Otitis“ in der zufälligen Stichprobe: 42

Berechnung der Prävalenz der **Otitis (ext./media)** = $42 / 3.933 * 100 = 1,1\%$

Eine **Querschnittsstudie** mit einer zufälligen und ausreichend großer **Stichprobe** ist die einzige Form einer Studie, die echte Prävalenzen liefern kann.⁴⁾

Prävalenzen

In der folgenden Tabelle sind die Prävalenzen der Erkrankungen bzw. Diagnosen von Heimkaninchen aufgeführt. Diese stammen aus Querschnittsstudien aus jeweils nur einer Klinik (Kirschbaum, 1994⁵⁾; Rheker, 2001⁶⁾; Langenecker, 2009⁷⁾) oder aus mehreren Kliniken (O'Neill et al., 2020⁸⁾ (107 Kliniken) und O'Neill et al., 2024⁹⁾ (1.224 Kliniken)).

Ausgewählt wurden die Studien, weil:

1. die Anzahl der Tiere (Stichprobe) sehr groß war,
2. die Auswahl der Tiere zufällig erfolgte, und
3. alle Daten der Tiere erfasst wurden, die in der jeweiligen Klinik vorgestellt wurden, das heißt auch von Tieren, die z. B. wegen Kastration, Impfung oder zur Routinekontrolle vorgestellt wurden.

Die Repräsentativität dieser Auswertungen ist durch den Fakt eingeschränkt, dass sie nur Tiere einbeziehen, die an Kliniken vorgestellt wurden. Die Aussagekraft der Studien von Kirschbaum, 1994, Rheker, 2001 und Langenecker, 2009 sind zusätzlich eingeschränkt, weil die Daten nur an jeweils 1 Klinik erhoben wurden.

In England wurde 2024 die Zahl von Heimkaninchen (Pet rabbits) auf 800.000 geschätzt¹⁰⁾. Legt man die gleiche Berechnungsgrundlage für Deutschland zugrunde (2% der erwachsenen Bevölkerung hält Kaninchen), ergäbe sich eine geschätzte Gesamtzahl von Heimkaninchen von ca. 1.000.000.

Tabelle: Häufigste Vorstellungsgründe bzw. Diagnosen von Heimkaninchen, in %

Diagnose	Kirschbaum, 1994 ¹¹⁾ n = 284	Rheker, 2001 ¹²⁾ n = 3.356	Langenecker, 2009 ¹³⁾ n = 2.125	O'Neill et al, 2020 ¹⁴⁾ n = 2.506	O'Neill et al., 2024 ¹⁵⁾ n = 3.933
Hauterkrankungen	11,4	0,6		20,2	16,3
Gebiss-/Zahnerkrankungen	17,7	16,4	14,0	14,9	18,23
Abszesse	3,0	8,7	8,0	1,9	1,6
Augenerkrankungen	10,2	1,2	7,0	7,3	9,2
Magen-/Darmtrakt	7,5	4,7		9,5	11,1
Frakturen		7,4	5,0	0,2	0,5
Trauma		4,2	8,0	4,0	5,9
Dyspnoe		1,9		3,7	0,3
Pneumonie		1,4		0,1	0,2
Tumore	2,1	2,4	5,0	0,6	0,3
Enzephalitozoonose		1,0	5,0*	1,6	1,6
Otitis	0,7	0,1		1,0	1,1

* Verdacht auf Grund der klinischen Manifestation und/oder eines positiven serologischen Nachweises mittels indirekter Immunfluoreszenz (IFAT) sowie dem Ausschluss von Differenzialdiagnosen wie Otitis media oder Ohrmilbenbefall

Prävalenzzeiträume der Studien:

- Kirschbaum, 1994: 1 Jahr
- Rheker, 2001: 10 Jahre
- Langenecker, 2009: 9 Jahre
- O'Neill et al, 2020: 1 Jahr
- O'Neill et al., 2024: 1 Jahr

Für weitere Daten verschiedener Prävalenzen von Krankheiten bei Heimkaninchen aus Studien siehe [Prävalenzen](#). Einige sind mit den Daten der vorstehenden Studien aus methodischen Gründen allerdings **nicht** vergleichbar.

1 2 1345

¹⁾ Conraths, F. J; Gethmann, J.; Schulz, J.; Amler, S.; Fröhlich, A.; Ziller, M.; Denzin, N. 2020. Epidemiologische Untersuchungen in Tierpopulationen. Ein Leitfaden zur Bestimmung von Stichprobenumfängen. 3., überarbeitete Auflage. Friedrich-Loeffler-Institut, Greifswald-Insel Riems. Online, Abruf am 11.02.2026 von https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00033966/Stichprobenuntersuchungen_20201119_final.pdf

³⁾ , ⁸⁾ , ⁹⁾ , ¹⁵⁾ Weiß, C. 2019. Medizinische Statistik. Springer. ISBN 978-3-662-56587-2

O'Neill, D. G., Williams, A., Brodbelt, D. C., Church, D. B., Hedley, J. 2024. Conformation-associated health in pet rabbits in the UK: A VetCompass cohort study. Vet Rec. 2024;e4396. <https://doi.org/10.1002/vetr.4396>

⁴⁾ Cockcroft, P. D., Holmes, M. A. Handbook of evidence-based veterinary medicine. Blackwell Publishing Ltd. ISBN 978-1-4051-0890-4

⁵⁾ , ¹¹⁾ Kirschbaum, P. (1994). Erhebungen zur Art und Indikation tierärztlicher Maßnahmen bei kleinen

Heimtieren. Diss. Tierärztliche Hochschule Hannover

⁶⁾ ¹²⁾

Rheker I. 2001. Untersuchung zur Bedeutung der Heimtiere in der tierärztlichen Fortbildung in Bezug zur Entwicklung des Heimtieranteils am Gesamtaufkommen der Patienten der Klinik für kleine Haustiere, der Klinik für Zier und Wildvögel sowie der Klinik für Fischkrankheiten der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Diss med vet, Tierärztliche Hochschule Hannover

⁷⁾ ¹³⁾

Langenecker, M.; Clauss, M.; Hässig, M.; Hatt, J. M. 2009. Vergleichende Untersuchung zur Krankheitsverteilung bei Kaninchen, Meerschnecken, Ratten und Frettchen. Tierärztliche Praxis. Ausgabe K, Kleintiere, 37(5):326-333

¹⁰⁾

PAW, 2024. People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) Animal Wellbeing Report 2024.

https://www.pdsa.org.uk/media/14944/pdsa_paw-report-2024.pdf

¹⁴⁾

O'Neill, D. G., Craven, H. C., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Hedley, J. 2020. Morbidity and mortality of domestic rabbits (*Oryctolagus cuniculus*) under primary veterinary care in England. Veterinary Record, 186(14), 451-451. <https://doi.org/10.1136/vr.105592>

From:

<https://www.wikikanin.de/> - **Wikikanin**

Permanent link:

<https://www.wikikanin.de/doku.php?id=praevalenz&rev=1774787911>

Last update: **2026/03/29 14:38**

